


しきゅうけい

# 子宮頸がん予防ワクチンのご案内



子宮頸がんは、女性特有のがんとしては乳がんに次いで罹患率が高く、特に20～30代のがんでは第1位となっています。

日本では、毎年約10,000人の女性が新たに子宮頸がんにかかり、約3,500人が子宮頸がんによって亡くなっています。

(左図はMSD社作成の“女性特有のがんを知っていますか。”より引用)

## 子宮頸がんの原因は？

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染が原因で起こることが知られています。HPVはとてもありふれたウイルスで、性交渉の経験がある女性の80%以上が、50歳までに感染を経験するといわれています。特に若い年代の感染率は非常に高いといわれています。



100種類以上の型があるHPVの中でも、15種類程度ががんを引き起こす可能性がある「高リスク型」と呼ばれています。このうち「16型」、「18型」が子宮頸がんの原因の約65%を占めています。

Onuki M, et al: Cancer Sci. 2009; 100(7):1312-1316.

ヒトパピローマウイルス(HPV)

子宮頸がんの原因となるHPVの代表… 16型 18型

## HPVは子宮頸がん以外の病気を引き起こすことがあります。

### 外陰上皮内腫瘍

発症に関係するHPV | 16型 18型

外陰上皮内腫瘍は、外陰がんの先行して見られる場合がある腫瘍で、HPV感染が原因となっているのは半数程度です。外陰がんは女性性器の外陰部に発生するがんで、婦人科のがんの約3%を占めます。

### 膣上皮内腫瘍

発症に関係するHPV | 16型 18型

膣上皮内腫瘍は膣がんへ進行する可能性がある腫瘍で、HPV感染が主な原因です。膣がんは、女性性器の膣にできるがんで、女性性器がんの約1%を占めます。

### 尖圭コンジローマ

発症に関係するHPV | 6型 11型

直径1～3ミリ前後の良性的イボが性器や肛門のまわりにできる病気です。痛みやかゆみがほとんどなく、さまざまな形状のイボができます。大きくなるとカリフラワーやニワトリのトサカのような状態になることもあります。再発しやすく完治は難しいといわれています。



子宮頸がんワクチン  
“ガーダシル”の対象は  
9歳以上の女性です。  
初回、2ヵ月後、6ヵ月後の  
3回接種で、1回0.5ml  
を筋肉内注射します。  
費用:1回 15,750 円



## ワクチンによる予防接種と定期的な検診で 子宮頸がんを予防しましょう。

子宮頸がんは、ワクチンの接種によってHPVの感染から体を守ることで予防できます。しかし、ワクチンを接種したからといって100%予防できるわけではありません。早期発見のためにワクチン接種とあわせて、定期的な子宮頸がん検診も重要です。



### ＜お問い合わせ＞

公益財団法人 埼玉県健康づくり事業団  
〒338-0824  
さいたま市桜区上大久保519番地  
埼玉県浦和大久保合同庁舎内  
営業推進課 Tel 048-859-5175

